

Cuprablau Z

Jesensko škropljenje sadovnjakov



Bakterija (*Erwinia amylovora*)-hrušev ožig



Breskov škrlup



Jablanov škrlup-močna okužba



Luknjičavost koščičarjev

Škropljenje opravimo s pripravkoma **Cuprablau Z** v odmerku od 3 do 4 kg/ha ali s pripravkom **Cuprablau Z Ultra** v odmerku od 2,5 do 3 kg/ha škropimo po pravilu pridelka, ko odpade večina listja.

Cuprablau Z zmanjšuje potencial jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*), ki prezimi v obliki askospor v odpadnem listju, z uporabo pa zmanjšano potencial glive za prihodnje leto.

Cuprablau Z pospešuje olesenitev lesa, odpadanje listja, s tem zmanjšuje možnost zimske pozebe, ki lahko poveča napad jablanovega raka (*Nectria galligena*).

Cuprablau Z uporabljamo tudi za učinkovito varstvo koščičastega sadja, pred okužbami glive breskove kodravosti (*Taphrina deformans*) in rožičavosti češpelj (*Taphrina pruni*), breskve in češplje poškopimo jeseni in spomladi in tako pravočasno zatremo brstiče glive, ki prezimijo pod lubjem.

Hkrati pripravka **Cuprablau Z** in **Cuprablau Z Ultra** zatirata tudi glivo, ki povzroča listno luknjičavost koščičarjev (*Stigmia carpophila*).



Breskova kodravost



Češpljeva rdeča listna pegavost



Rožičavost češpelj



Jablanov rak



KYLEO®

The weed twister

NOVO

PRVI PRAVI TOTALNI HERBICID!

Vodotopni koncentrat (SL).

Vsebuje: 2,4-D, 160 g/L + Glifosat, 240 g/L

KYLEO® je kombinacija dveh dopolnjujočih se aktivnih snovi z različnima mehanizmoma delovanja za vidno hitrejše in močnejše delovanje ob nižjih koncentracijah glifosata - DVOJNA MOČ PROTI PLEVELOM, IZJEMNO UČINKOVIT PROTI PRESLIC!

Uporaba v sadovnjakih v odmerku 3-5 L/ha (30-50 mL na 100 m²), odvisno od vrste plevela. Tretira se enkrat v rastni sezoni. Odsvetuje se tretiranje v času cvetenja sadnega drevja in prvo leto po sajenju.