

# Cuprablau Z 35 WP

## Škropljenje sadovnjakov po obiranju



Jablanov škrlup



Jablanov rak



Hrušev ožig



Bakterijski ožig  
aktinidije



Breskova kodravost



Bakterijska  
pegavost orehov

Škropljenje opravimo s pripravkom **Cuprablau Z 35 WP** v odmerku 3 kg/ha (škropimo po spravi pridelka).

**Cuprablau Z 35 WP** zmanjšuje potencial jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*), ki prezimi v obliki askospor v odpadnem listju, z uporabo pa bistveno zmanjšamo potencial glive za prihodnje leto.

**Cuprablau Z 35 WP** uporabljamo tudi za učinkovito varstvo koščičastega sadja pred okužbami glive breskove kodravosti (*Taphrina deformans*). Breskve poškopimo jeseni in spomladi in tako pravočasno zatremo brstiče glive, ki prezimijo pod lubjem.

Na aktinidiji uporabljamo pripravek **Cuprablau Z 35 WP** za zatiranje bakterijskega ožiga aktinidije (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*), gnilobe koreninskega vratu (*Phytophthora cactorum*, *hytophthora* spp.), alternarijske

listne pegavosti (*Alternaria alternata*) in bakterijske pegavosti (*Pseudomonas viridi ava*) v odmerku 2 kg/ha. Tretiranje se opravi v jeseni po spravi pridelka in odpadanju listja.

Na lupinarjih (oreh, leska) uporabimo **Cuprablau Z 35 WP** za zatiranje orehove (lešnikove) črne listne pegavosti (*Xanthomonas campestris*) v odmerku 2 kg/ha. Tretiranje se opravi jeseni po spravi pridelka in odpadanju listja.

V jagodah za zatiranje bele jagodne listne pegavosti (*Mycosphaerella fragariae*) in jagodne rdeče listne pegavosti (*Diplocarpon earliana*) v odmerku 1,5 kg/ha.

Na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (*Cyloconium oleaginum*) v odmerku 2 kg/ha. Priporočila se tretiranje po obiranju oljk od BBCH 90 naprej.

### AGRO NASVETI

051 367 008 (Vili Kurnik)

031 504 512 (Nande Osojnik)



CINKARNA

[www.cinkarna.si](http://www.cinkarna.si)