



HERBOCID XL

Vodotopni koncentrat (SL).

Vsebuje

2,4 D v obliki DMA 600 g/l (60,1 % w/w).

Embaliranje

1 l

Značilnosti

Herbocid XL je herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) in koruzi.

Pri škropljenju je treba preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Način delovanja

Selektivni sistemični, translokacijski herbicid, ki se kopiči predvsem na meristemskih tkivih poganjkov in korenin. Deluje kot zaviralec rasti. Na učinkovitost pozitivno delujejo višje temperature in sončni žarki.

Uporaba

Herbocid XL se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela:

- v koruzi: v odmerku 1,25 l/ha ob porabi 400–500 l vode/ha. Tretira se v času, ko ima koruza razvite 3–4 liste oziroma je visoka 15–20 cm (BBCH 13-14).
- v pšenici, ječmenu, rži in tritikali: v odmerku 1,25 l/ha ob porabi vode 400–500 l/ha. Tretira se od sredine do konca razraščanja (BBCH 14-29).

Sredstvo Herbocid XL dobro zatira:

njivski slak (*Convolvulus arvensis*), njivsko gorjušico (*Sinapis arvensis*), njivski osat (*Cirsium arvense*), njivski mošnjak (*Thlaspi arvense*), navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*), koprive (*Lamium* spp.), metlike (*Chenopodium* spp.), kislice (*Rumex* spp.), poljski mak (*Papaver rhoeas*) in zlatičevke (*Ranunculus* spp.). Slabše zatira: kamilice (*Matricaria* sp.), plezajoče lakote (*Galium aparine*), dresni (*Persicaria* spp.), jetičnike (*Veronica* spp.), (*Fumaria officinalis*), vijolice (*Viola* spp.), srhkodlakavi ščir (*Amaranthus retroflexus*), njivsko spominčico (*Myosotis arvensis*), navadni kristavec (*Datura stramonium*) in krvomočnice (*Geranium* sp.).

Opozorila

Herbicidov na podlagi 2,4 D ne smemo uporabljati v semenski koruzi. Sredstvo lahko uporabimo na isti površini le enkrat na leto. Tretiramo pri temperaturah med 5 in 30 °C. Sredstva ne smemo uporabljati v vetrovnem vremenu.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v skladu z navodilom za uporabo, ni fitotoksično. Herbocid XL, uporabljen v večjih količinah ali ob nepravem času, lahko deluje ob neugodnih pogojih fitotoksično. Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke, sadno drevje, vinsko trto in metuljnice (belo in črno deteljo).

Delovna korenca

Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

Mešanje z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi

Sredstvo lahko mešamo z nekaterimi drugimi herbicidi; njihov nabor delovanja je tako širši.

Priprava sredstva za uporabo

Embalažo izpraznimo, speremo z vodo in dodamo škropilni brozgi v rezervoarju. Nastale ostanke škropiva razredčimo v razmerju 1 : 10 in poškopimo na že poškopljeni površini.

Ravnanje z embalažo in neporabljenim sredstvom

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek.

Pogoji skladiščenja

Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred vlago in virom toplote, pri temperaturi med 5 in 30 °C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Ime in naslov imetnika registracije

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija.

Zastopnik za Slovenijo

Cinkarna Celje, d. d., Kidričeva 26, 3000 Celje. T: 03 427 62 29.