



## CUPROVIN 50 'Gnojilo ES'

*Tip gnojila: E.1.3g; ime snovi po EINECS-u: bakrov oksiklorid*

Anorgansko mineralno gnojilo z mikroelementom baker (Cu), iz bakrovega oksiklorida, namenjeno foliarnemu gnojenju kmetijskih rastlin, v obliki praška za suspenzijo (WP).

### Vsebuje

baker ( $\text{Cu}^{2+}$ ), 50 % (m/m)

### Uporaba

Bakrovo gnojilo uporabljamo za foliarno gnojenje kmetijskih rastlin med vegetacijo, zlasti v obdobju potreb po bakru. Predlagana priporočila so splošne narave. Upoštevati moramo potrebe posameznih kultur in njihove pogoje za gojenje.

### Priporočeni odmerki

Kultura	Odmerek s škropljnjem (čas uporabe)	Poraba vode
Vinska trta	do 1,0 kg/ha (zgodnja faza razvoja)	do 750 l/ha
Pečkato sadje (jabolka, hruška)	do 2,0 kg/ha (zgodnja faza razvoja, po spravilu)	do 750 l/ha
Koščičasto sadje (breskve, marelice, nektarine, češnje ...)	2,0–3,0 kg/ha (po spravilu plodov)	do 750 l/ha
Jagode	do 1,0 kg/ha (pred cvetenjem in po spravilu)	do 750 l/ha
Čebula	do 1,0 kg/ha (začetna faza razvoja)	do 750 l/ha
Krompir, paradižnik, kumare	do 2,0 kg/ha (celotna vegetacija)	do 750 l/ha
Oljka	do 1,0 kg/ha (2–3 aplikacije v času vegetacije)	do 750 l/ha
Lupinarji (orehi, lešniki)	2,0–3,0 kg/ha (pred in po cvetenju)	do 750 l/ha
Žita	do 1,0 kg/ha (zgodnja faza razvoja)	do 750 l/ha

Gnojilo ne sme nekontrolirano prehajati v okolje in mora biti všteto v bilanci letnega vnosa bakra na istem zemljišču

