




PRIMERNA TUDI ZA EKOLOŠKO VARSTVO SADOVNJAKOV

Za prvi sadjarjev korak...



BBCH 54 - 59

Optimalni čas za škropljenje pečkastega sadja (jablana, hruška)



NOVO!

CUPRABLAU Z 35 WG v 100g pakiranju. Lahko se prodaja brez predložitve potrdila o pridobitvi znanj iz fitofarmacije.

Cuprablau Z

Zaradi previsokih temperatur v zadnjem obdobju je potrebno koščičasto sadje čim prej poškropiti, vsekakor pred prvimi padavinami, saj glive iz rodu (*Taphrina*) povzročajo bolezni koščičarjev, najbolj znana je **breskova kodravost** (*Taphrina deformans*), ki brste okuži takoj, ko se le ti pričnejo odpirati, pogosto se srečamo tudi z **rožičavostjo češpelj** (*Taphrina pruni*). Tudi, če bo prišlo v prihodnjem tednu do znižanja temperatur, to ne bo zmanjšalo nevarnosti okužb z breskovo kodravostjo, v primeru padavin.

Prvo škropljenje breskev in ostalih koščičarjev opravimo s pripravkoma **Cuprablau Z 35 WP** v odmerku 3 kg/ ha, [30g/10L) vode ali **Cuprablau Z 35 WG** v odmerku 1,6 - 2,1 kg/ha, [21g/10 L vode), **ko se pričnejo odpirati konice luskolistov**. Istočasno pripravka **Cuprablau Z 35 WP** ali **Cuprablau Z ultra** zatirata tudi glivo, ki povzroča **listno luknjičavost koščičarjev** (*Stigmia carpophila*).

Škrlup je najpomembnejša bolezen jablan in hrušk. Gliva (*Venturia inaequalis*) povzročiteljica boleznih prezimi v **odpadnem listju**. Za preprečevanje primarnih okužb uporabite pripravka **Cuprablau Z 35 WP** v odmerku 3 kg/ ha, [30g/10 L) vode ali **Cuprablau Z 35 WG** v odmerku 1,6 - 2,1 kg/ha, [21g/10 L vode) v 7 do 10 dnevni razmikih. Priporoča se škropljenje v fenološki fazi od mišjega ušesa do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54-59).

Pripravek Cuprablau Z 35 WP in Cuprablau Z 35 WG delujeta tudi: Proti **jablanovemu raku** (*Nectria galligena*), proti **navadni sadni gnilobi/skladiščni moniliji** (*Monilia fructigena*), proti **gnilobi koreninskega vratu jablan in hrušk** (*Phytophthora cactorum*) proti **bakterijskemu hruševemu ožigu** (*Erwinia amylovora*). Predviden čas prvega škropljenja jabolk in hrušk s pripravkoma Cuprablau Z bo v drugi polovici meseca marca.

www.cinkarna.si

 **CINKARNA**